

☆定期予防接種の種類と受け方☆

例) ○歳に至るまで } → ○歳の誕生日の前日まで
 ○歳未満

| 予防接種 | 対象年齢 | 間隔及び回数(標準) |
|--|---|---|
| B型肝炎 | 生後1歳に至るまで (標準期間:生後2月～生後9月未満) | 3回 ※1回目の接種から3回目が終わるまでには、おおよそ半年間かかります。 |
| ヒブワクチン | 初回:生後2月～生後60月(5歳)に至るまで (標準期間:生後2月～生後7月未満) | 初回:3～2回 27日～56日の間隔で3～2回接種 ※接種開始年齢により接種回数が変わります。 |
| | 追加:生後2月～生後60月(5歳)に至るまで | 初回免疫終了後7月～13月あけて1回 |
| 小児用肺炎球菌 | 初回:生後2月～生後60月(5歳)に至るまで (標準期間:生後2月～生後7月未満) | 初回:3～2回 27日以上の間隔で3～2回接種 ※接種開始年齢により接種回数が変わります。 |
| | 追加:生後2月～生後60月(5歳)に至るまで | 初回終了後60日間以上あけて1回 |
| 四種混合 (ジフテリア・破傷風・百日咳・不活化ポリオ) | 1期初回:生後3月～生後90月(7歳半)に至るまで (標準期間:生後3月～生後12月未満) | 初回:3回 20日～56日までの間隔をあけて3回接種 |
| | 1期追加:生後3月～生後90月(7歳半)に至るまで | 追加:1回 1期初回の3回目接種終了後、6月以上あけて1回接種 |
| 二種混合 (ジフテリア・破傷風) | 11歳～13歳未満 (標準期間:11歳～12歳未満) | 1回 |
| BCG | 生後1歳に至るまで (標準期間:生後5月～生後8月未満) | 1回 期間が短いので早めに受けましょう。 |
| 麻しん風しん混合 | 1期:生後12月～生後24月に至るまで | 1回 期間が短いので早めに受けましょう。 |
| | 2期:5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間(年長児) | 1回 期間が短いので早めに受けましょう。 |
| 水痘 | 生後12月～生後36月に至るまで | 2回 1回目接種後3月以上あけて2回目を接種 |
| 日本脳炎 | 1期初回:6月～生後90月(7歳半)に至るまで (標準期間:3歳～4歳未満) | 初回:2回 6日～28日までの間隔をあけて2回接種 |
| | 1期追加:6月～生後90月(7歳半)に至るまで (標準期間:4歳～5歳未満) | 追加:1回 初回接種後6月以上をあけて1回接種 |
| | 2期:9歳～13歳未満 (標準期間:9歳～10歳未満) | 1回 |
| | 平成7年4月2日～平成21年10月1日生まれの方(ただし20歳未満)は特例があります。特例についてはお問合せください。 | |
| 子宮頸がん | 小学6年生～高校1年生相当の女子 ※平成25年～接種勧奨差し控え中。 希望者は副作用等理解したうえで接種可能。 | 2価(サーバリックス):3回 |
| | | 4価(ガーダシル):3回 |