



接種間隔について（異なった種類のワクチンを接種する場合）

| |
|-----------------|
| 生ワクチン |
| 麻しん風しん混合、BCG、水痘 |
| おたふくかぜ、ロタウイルス |

別の種類のワクチン

接種を行う日まで

27日以上おく

不活化ワクチン

生ワクチン

| |
|----------------|
| 不活化ワクチン |
| 四種混合、二種混合、日本脳炎 |
| B型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌 |

別の種類のワクチン

接種を行う日まで

6日以上おく

不活化ワクチン

生ワクチン

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

生ワクチン接種日
(BCG・MR・水痘)

次の予防接種は、
この日から可能です。
(**4週間後**)

不活化ワクチン接種日
(四種混合・二種混合・日本脳炎・
B型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌)

次の予防接種は、
この日から可能です。
(**1週間後**)



※同じ種類のワクチンを接種する時は、

それぞれのワクチンに定められた接種間隔となります。