

☆定期予防接種の種類と受け方☆

例) ○歳に至るまで

○歳未満



○歳の誕生日の前日まで

予防接種	対象年齢	間隔及び回数(標準)
ロタウイルス	ロタリックス: 出生6週0日後～24週0日後まで	2回(27日以上の間隔をあけて2回接種)
	ロタテック: 出生6週0日後～32週0日後まで	3回(27日以上の間隔をあけて3回接種)
	※初回接種は出生14週6日までに接種 (出生15週0日以降の初回接種は人吉市の指定医療機関では接種できません。)	
B型肝炎	生後1歳に至るまで (標準期間: 生後2月～生後9月未満)	3回 ※1回目の接種から3回目が終わるまでには、約半年間かかります。
ヒブワクチン	初回: 生後2月～生後60月(5歳)に至るまで (標準期間: 生後2月～生後7月未満)	初回: 3～2回 27日～56日の間隔で3～2回接種 ※接種開始年齢により接種回数が変わります。
	追加: 生後2月～生後60月(5歳)に至るまで	初回免疫終了後7月～13月あけて1回
小児用肺炎球菌	初回: 生後2月～生後60月(5歳)に至るまで (標準期間: 生後2月～生後7月未満)	初回: 3～2回 27日以上の間隔で3～2回接種 ※接種開始年齢により接種回数が変わります。
	追加: 生後2月～生後60月(5歳)に至るまで	初回終了後60日間以上あけて1回
四種混合 (ジフテリア・破傷風・百日咳・不活化ポリオ)	1期初回: 生後3月～生後90月(7歳半)に至るまで (標準期間: 生後3月～生後12月未満)	初回: 3回 20日～56日までの間隔をあけて3回接種
	1期追加: 生後3月～生後90月(7歳半)に至るまで	追加: 1回 1期初回の3回目接種終了後、6月以上あけて1回接種
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳～13歳未満 (標準期間: 11歳～12歳未満)	1回
BCG	生後1歳に至るまで (標準期間: 生後5月～生後8月未満)	1回 期間が短いので早めに受けましょう。
麻しん風しん混合	1期: 生後12月～生後24月に至るまで	1回 期間が短いので早めに受けましょう。
	2期: 5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間(年長児)	1回 期間が短いので早めに受けましょう。
水痘	生後12月～生後36月に至るまで	2回 1回目接種後3月以上あけて2回目を接種
日本脳炎	1期初回: 6月～生後90月(7歳半)に至るまで (標準期間: 3歳～4歳未満)	初回: 2回 6日～28日までの間隔をあけて2回接種
	1期追加: 6月～生後90月(7歳半)に至るまで (標準期間: 4歳～5歳未満)	追加: 1回 初回接種後6月以上をあけて1回接種
	2期: 9歳～13歳未満(標準期間: 9歳～10歳未満)	1回
	平成7年4月2日～平成21年10月1日生まれの方(ただし20歳未満)は特例があります。 特例についてはお問合せください。	
子宮頸がん	小学6年生～高校1年生相当の女子 ※平成25年～接種勧奨差し控え中。 希望者は副作用等理解したうえで接種可能。	2価(サーバリックス): 3回
		4価(ガーダシル): 3回